



SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

BROMO RAT PASTA

BIOCIDA – Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2014/00270/MRS

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN PASTA FRESCA PER USO PROFESSIONALE

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b a 100 g

Caratteristiche

BROMO RAT PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*) e Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) anche dopo una singola ingestione.

BROMO RAT PASTA contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

Può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà e nelle fognature.

Il prodotto è di colore rosso ed è aromatizzato alle Arachidi.

Istruzioni, modalità d'uso e dosi d'impiego

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.

Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio. I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che il contenitore sia fissato in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico: fino a 40 g ogni 5 m (infestazione bassa) o ogni 2 m (infestazione alta).

Ratto grigio: fino a 200 g ogni 10 m (infestazione bassa) o ogni 5 m (infestazione alta).

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le esche consumate. Durante le operazioni di controllo, rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Usare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Confezioni

Esche rodenticide da 10 g cadauna, in carta alimentare
Scatola da 10 Kg 2-1-130-9X10

